

押し
あける

ツインズルスプレーの特徴

のどの痛み・はれに直接届く

イメージ図



持ち運び
しやすい
キャップ付き

【効能・効果】 のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれのどの不快感・声がれ
【用法・用量】 1日数回 適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。
【用法・用量に関連する注意】 ●定められた用法・用量を厳守してください。●ノズルののどの患部にむけて、アースと声を出しながら2~3回直射してください。(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります。) ●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。●本剤はのどの患部への噴射塗布のみに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。●目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。

【販売】
シオノギヘルスケア株式会社
大阪市中央区北浜2丁目6番18号

【製造販売元】
iNova Pharmaceuticals Japan
株式会社
東京都中央区八丁堀4-3-5

この製品は外側を
透明フィルムで
ラッピングしています。

®: イソジンはイノヴァ
ファーマの登録商標です。

【成分・分量】 1mL中 ポビドンヨード 4.5mg (有効ヨウ素として0.45mg) 添加物として L-メントール、プロピレングリコール、D-ソルビトール液、グリセリン、エタノール、香料、その他1成分を含有しています。

【成分・分量に関連する注意】 ●本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯など)が変色することがあります。

【保管および取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)(4)衣服などに付着すると着色しますのでご注意ください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。(5)火気に近い近づけないでください。(6)ノズルの先端を針などで突くと折れたときに大変危険ですので、絶対にやめてください。(7)本剤を使用しているとき最後に噴射しきれずに容器内に薬液が残りますが、表示された内容量を噴射できるよう考慮した量を入れてあります。(8)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

お問い合わせ窓口

大阪 06-6209-6948
東京 03-3406-8450
受付時間9時~17時(土、日、祝日を除く)

製造
番号
使用
期限

副作用被害救済制度の
お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931

25mL

イソジン® のどフレッシュ

— ポビドンヨード配合 —

のどの痛み・はれに 直接効く



キャップ
付き



クリアミント風味 第3類医薬品

△ 使用上の注意

【してはほいさないこと】 × (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください。本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人。2. 長期運用しないください
【相談すること】 ● 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください (1)妊婦または妊娠していると思われる人 (2)授乳中の人 (3)薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人 (4)口内のむとれた人のある人 (5)甲狀腺機能障害(甲状腺の病気)の診断を受けた人 2. 次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
【症状】 発疹・発赤、かゆみ、しめみ、灼熱感、刺激感 (3)消化器: 吐き気 (4)その他: 不快感、まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。
【症状の名称】 ショック(アナフィラキシー)
【症状】 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかゆみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
3. 5~6日間使用しても症状がよくならぬ場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。