

この説明文書は使用前に必ずお読みください。
また必要なとき読めるように保存しておいてください。

イソジン®ウォッシュ

第3類医薬品

⚠️ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- 次の部位には使用しないでください
(1) 損傷のある皮膚
(2) 目の周囲、粘膜など

相談すること 🗣️

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

ISODINE® WASH

使い方

- 1 本剤を適量手にとり、水を少量加えてください。
- 2 よく泡立てながら、手指または皮膚をていねいに擦り洗いしてください。
- 3 そのあと、流水などで洗い流してください。

お問い合わせ窓口

大阪 06-6209-6948
東京 03-3406-8450
受付時間9時~17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931

使用期限

製造番号



イソジン® ウォッシュ

洗浄タイプ



細菌・ウイルス | 殺菌消毒

外用殺菌消毒薬

(内服やうがいには使用しないでください。)

効能・効果

手指・皮膚の殺菌・消毒

用法・用量

本剤の適量を取り、少量の水を加えて摩擦し、よく泡立てて水洗いしてください。

【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤は外用のみに使用し、内服やうがいには使用しないでください。
- 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 石けんなどの併用は本剤の殺菌・消毒作用を弱めることがあるので石けん分を洗い落としてからご使用ください。

成分・分量

1mL中 ポビドンヨード75mg(有効ヨウ素として7.5mg)
添加物として pH調整剤、その他2成分を含有しています。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (4) 衣服などに付着した場合は、すぐに水でよく洗い落としてください。
- (5) 銀を含有する製品を変色させるので、貴金属類は外してからご使用ください。
- (6) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

[販売]
シオノギヘルスケア株式会社
大阪市中央区北浜2丁目6番18号

[製造販売元]
iNova Pharmaceuticals Japan
株式会社
東京都中央区八丁堀4-3-5

®: イソジンおよびISODINEはアイノヴァファーマの登録商標です。



第3類医薬品

2L

ISODINE® WASH